



مرض الحمى القلاعية

يصيب الخنازير، الأبقار و المجاترات الصغيرة

الأعراض السريية

الإجهاض
والموت المفاجي
لحديثي الولادة

فقدان الشهية

الخمول

حمى

عرج

انخفاض انتاج الحليب

سيلان اللعاب

حويصلات وآفات

انتبه



في الأغنام
والماعز
غالبا ما تكون
الأعراض
السريية طفيفة
أو من الصعب
ملاحظتها

التعرف على المرض

آفات في الحيز
ما بين الحوافر،
غالبا ما تكون
مصحوبة بالعرج.

اللعاب
وآفات بالفم.



© FAO/EuFMD

طرق انتقال المرض

أهم طرق إنتقال المرض.

الإتصال
المباشر
الحيوانات



ثاني أهم طرق انتقال المرض هو تناول منتجات حيوانية مصابة. على سبيل المثال تغذية صغار الحيوانات من فضلات طعام الإنسان أو الحليب الغير المعالج.

المنتجات
الحيوانية



يمكن لجزيئات الفيروس ان تنتقل بطرق اخرى ميكانيكيا على أجسام غير حية مثل الأحذية، الملابس، الأدوات البيطرية أو المركبات.

الإنتقال
الميكانيكي



الانتقال عن طريق الرياح ليس شائعاً ولكنه ممكن، خاصة إذا كانت مزارع الخنازير الكبيرة موجودة في المنطقة المجاورة، وتحت ظروف معينة (الدرجات الحرارة المنخفضة والرطوبة العالية مناسبة لإنتقال الفيروس عن طريق الرياح).

الرياح

