

De las 324.000 vacas y novillas que forman esta cabaña nacional, 201.000 se utilizan sobre todo para la producción de la leche destinada a la venta y el resto para la cría de terneros de carne. La producción de las tres razas lecheras principales registrada en 1961 se ilustra en las cifras siguientes:

CUADRO 45. - PRODUCCIÓN DE LAS TRES RAZAS LECHERAS PRINCIPALES EN IRLANDA DEL NORTE (1961)

Raza	Todas las vacas sometidas a comprobación		Rebaño con el máximo promedio		Vaca de máxima producción	
	Leche	Grasa	Leche	Grasa	Leche	Grasa
	<i>Kilogramos</i>	<i>Porcentaje</i>	<i>Kilogramos</i>	<i>Porcentaje</i>	<i>Kilogramos</i>	<i>Porcentaje</i>
Shorthorn lechera .....	3 492	3,59	4 587	3,62	7 034	4,62
Ayrshire .....	4 109	3,93	4 910	3,99	8 770	3,84
Frisona británica .....	4 522	3,64	5 179	3,73	9 441	3,60

#### ISLAS DEL CANAL

Las islas del Canal, situadas entre los 49° y 50° de latitud norte frente a la costa de Normandía, están formadas por cuatro islas principales: Jersey (117 km<sup>2</sup>), Guernsey (65 km<sup>2</sup>), Sark (5 km<sup>2</sup>) y Alderney (8 km<sup>2</sup>). Según el censo de 1962, existían 9.178 animales Jersey en la isla, de los cuales 5.401 eran vacas lecheras distribuidas en unos 700 rebaños. Por no haberse permitido la entrada de sangre exótica más de 150 años, el ganado Jersey de la isla podría considerarse como un gran rebaño en el cual se utilizan 100-150 toros. Con la excepción de 160 cabezas de ganado, todos los animales están inscritos en el Libro genealógico, pero sólo el 30 por ciento aproximadamente está sujeto a control lechero.

#### República de Irlanda

La República de Irlanda cubre aproximadamente el 83 por ciento de la superficie de Irlanda y es montañosa en sus zonas occidental y meridional. El punto máximo de la isla es Carrantuohill, en las montañas Kerry del sudoeste, con una altitud de 1.041 metros, mientras que en el sudeste la cumbre más alta de las montañas

Wicklow alcanza los 927 m. El centro de Irlanda lo constituyen tierras bajas recorridas por algunas cadenas montuosas con suelos morrénicos o turbosos que descansan sobre un sustrato de caliza marina. Las condiciones de esta región baja son en general buenas, pero en las zonas pantanosas los pastos son pobres.

El clima es netamente marítimo, con veranos frescos e inviernos suaves, y la precipitación está distribuida con bastante uniformidad a lo largo del año. Debido a sus extensas zonas de pastos y a la verdura de la vegetación durante casi todo el año, Irlanda ha merecido el nombre de «Isla Esmeralda»: El 48 por ciento aproximadamente de la superficie del país está cubierta por prados y pastizales y sólo el 20 por ciento por tierras labrantías.

En relación con su población humana, Irlanda posee un mayor número de cabezas de ganado que ningún otro país europeo. Se exportan a Inglaterra bovinos para el matadero o para el engorde y sacrificio a razón de medio millón por año. En el Cuadro 46 se da la población bovina del Eire, junto con el rendimiento lechero comprobado para 1960/61 (rebaño de máxima producción y vaca de máxima producción).

CUADRO 46. — POBLACIÓN BOVINA Y RENDIMIENTO LECHERO DE LAS VACAS DE LA REPÚBLICA DE IRLANDA

	Cabaña nacional	Rebaño de máxima producción		Vaca de máxima producción	
		Leche	Grasa	Leche	Grasa
	Porcentaje	Kilogramos	Porcentaje	Kilogramos	Porcentaje
Shorthorn .....	76	3 936	4,15	8 107	3,68
Frisonas .....	8	5 710	3,81	8 291	3,37
Kerry .....	1	3 235	3,50	6 095	3,62
Aberdeen Angus .....	4	—	—	—	—
Hereford .....	10,7	—	—	—	—
Guernesey .....	} 0,3	2 627	4,86	5 984	4,15
Jersey .....		3 615	4,90	6 220	4,78
Ayrshire .....		4 607	3,95	6 898	4,35

La producción media de leche de todas las vacas sometidas a comprobación fue de 2.964 kg, con un 3,70 por ciento de grasa (1960/61).