


PESTE PORCINE AFRICAINE (PPA)

Ne laissez pas vos porcs mourir de la Peste Porcine Africaine !
Appliquez ces mesures de biosécurité de base pour maintenir la PPA hors de votre ferme :

1. Hygiène personnelle



Changez toujours vos vêtements et vos chaussures avant de vous occuper de vos porcs



Lavez-vous soigneusement les mains avec du savon



Désinfectez vos bottes à l'entrée de chaque enclos

2. Maintenez la ferme et les enclos propres et bien rangés



Nettoyez régulièrement la ferme et les enclos



Nettoyez les outils et utilisez-les uniquement pour vos porcs




Désinfectez régulièrement votre ferme en pulvérisant du désinfectant ou de la poudre de chaux

3. Alimentation



Il n'est pas recommandé de donner les restes de cuisine à manger aux porcs



Si vous le faites, cuisez bien les restes de cuisine (100 °C/30 min) en les remuant avant de les donner aux porcs



Ne réutilisez pas l'eau qui a servi à nettoyer la viande pour la nourriture des porcs

4. Accès à la ferme

Ne laissez entrer que les véhicules et le personnel autorisés dans votre ferme

N'autorisez personne à entrer dans l'enclos des porcs à l'exception des travailleurs s'occupant des porcs

5. Maintenez votre troupeau en bonne santé

Construisez une clôture pour éviter tout contact avec d'autres porcs. Une double clôture est recommandée.

Gardez les animaux nouvellement introduits séparés de vos porcs pendant au moins 30 jours

Assurez-vous de la bonne santé des porcs avant que ceux-ci ne s'accouplent avec vos truies