





بیماری کانگو یا تب خون ریزی دهنده چیست؟

بیماری تب خونریزی دهنده یا کانگو یک بیماری ویروسی است که عامل آن بوسيله گزیدن کنه سرایت می نماید، در نشخوار کننده ها بخصوص گوسفند، بز و گاو سبب تب و بیماری خفیف میشود. بیماری از حیوانات و کنه ها به انسان ها سرایت کرده و باعث بیماری شدید تب خونریزی دهنده در آنها میگردد.



سرایت بیماری

۱. از طریق گزیدن کنه آلوده به ویروس کانگو به حیوان یا انسان سرایت میکند.
۲. تماس با خون، مایعات بدن و انساج حیوانات مبتلا به بیماری کانگو در جریان ذبح و بعد از ذبح حیوان.
۳. تماس با خون و مایعات بدن شخص مبتلا به تب کانگو.
۴. از طریق کشتن کنه با دست برهنه.



چه کسانی بیشتر در معرض خطر ابتلا به بیماری کانگو یا تب خونریزی دهنده قرار دارند؟

۱. قصابان و آنهاییکه حیوانات را ذبح میکنند.
۲. کارمندان صحت حیوانی و صحت عامه.
۳. کسانیکه در زراعت و مالداري مشغول اند.
۴. کسانیکه با گوشت و دیگر محصولات حیوانات سر و کار دارند.
۵. اعضای فامیل و مراقبت کننده گان شخص مبتلا به بیماری کانگو.
۶. چوپان ها یا کسانیکه با حیوانات سر و کار دارند.
۷. جلابان و کسانیکه در مارکیت خرید و فروش حیوانات کار میکنند.

علائم بیماری کانگو یا تب خون ریزی دهنده در انسانها

دوره مخفی این بیماری طور اوسط ۴ روز و حد اکثر آن ۱۳ روز میباشد. معمولاً تا روز چهارم بیماری علائمی مانند تب، سردرد، احساس سرما، خستگی، درد عضلات، پرخونی روی، پرخونی انساج چشم، استفراغ و درد های منتشر شکم مشاهده میگردد. لکه های کوچک سرخ رنگ یا بنفش ناشی از خونریزی در انساج مخاطی دهن و پوست، خونریزی از بیره ها، بینی، معده، روده ها، رحم و زیر پوست بخصوص در ناحیه ساق پا و ساعد میباشد. مرگ بیمار ناشی از شوک به دنبال خونریزی شدید، عفونت منتشر و اختلال انعقادی داخل عروقی پیش رونده است. مرگ و میر ناشی از این بیماری در انسان ها به ۳۰ فیصد میرسد.





گرفتن کارد یا چاقو در دهن

روش های پیش گیری از بیماری کانگو یا تب خونریزی دهنده

۱. استفاده از لباس های محافظتی (دستکش و چپن های آستین دار با دامن دراز) در اثنای ذبح حیوانات حتمی میباشد.
۲. در اثنای ذبح و یا پوست کردن حیوانات از گرفتن کارد یا چاقو در دهن جداً امتناع ورزید.
۳. با دستان خراش و زخمی از توتّه و پارچه کردن گوشت حیوانات جداً خودداری نمائید.
۴. از خوردن جگر، گوشت و دیگر محصولات حیوانی نیم پز جداً اجتناب نمائید.
۵. در هنگام مراقبت از بیمار مبتلا به کانگو دست هایتان را وقتاً فوقتاً با آب و صابون شستشو نمائید.
۶. از دور نمودن یا از بین بردن کنه ها با دستان برهنه جلوگیری نمائید.
۷. جهت محو کنه ها از محلات بود و باش حیوانات بوسیله محلول پاشی با دوکتوران بخش صحت حیوانی مشوره نمائید.
۸. پس از پاک کاری محل بود و باش حیوانات دستان تان را همیشه با آب و صابون شستشو نمائید.
۹. کارمندان صحتی، اقارب بیمار بشمول افراد ذیدخل به بیماری باید از لباس های محافظتی (کلاه، ماسک، پیش بند پلاستیکی و کفش یا موزه) استفاده نمایند.
۱۰. از شیوع بیماری به اسرع وقت به نزدیکترین کلینیک صحت حیوانی گزارش دهید.



دوا پاشی طویله غرض از بین بردن حامل بیماری کانگو



www.fao.org/afghanistan



@FAOAFGHANISTAN



FAO Afghanistan

FAO Representation in Afghanistan
FAO-AF@fao.org
Kabul, Afghanistan

Food and Agriculture Organization
of the United Nations

